

PBLS Zweihelfer Profi AHA SRC

Name und Klasse Studierende/r: _____

Spezielles: Es wird angenommen, dass die Helfer in zivil und ohne Hilfsmittel auf den Patienten treffen
Material: Säuglings- oder Kleinkindpuppe, Einmalhandschuhe

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt OSCE nicht erfüllt Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

Ausgangslage: PBLS-Puppe in Bauchlage	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Selbstschutz sicherstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Handschuhe anziehen oder benennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 "Ansprechbarkeit prüfen – leicht an den Schulter rütteln => nur nach AHA!"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Atmung prüfen – Der Patient atmet nicht (oder nicht normal) Puls prüfen (A. brachialis bei Säuglingen, A. carotis bei Kleinkindern) innert 10 Sekunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Um Hilfe rufen und alarmieren und AED anfordern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Patienten auf einer harten Unterlage lagern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 15 Thoraxkompressionen durchführen (Druckpunkt Brustbein untere Hälfte wählen, Handballen bzw. Finger der einen Hand auf dem Sternum platzieren, mit gestrecktem Armen aus der Hüfte den Thorax mit einer Frequenz von 100-120 / min, 1/3 des Thoraxdurchmesser Tiefe, dann vollständige Entlastung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 2x beatmen, Kopf überstrecken, ggf. Schultern unterpolstern, Unterkiefer anheben, Mund des Patienten schliessen, den eigenen Mund über der Nase des Patienten platzieren, zwei Atemstösse geben, alternativ ist Mund zu Mund Beatmung möglich. Bei Säuglingen simultan Beatmung in Mund und Nase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 Beatmen so, dass Brustkorbhebung sichtbar ist. Dauer je ca. 1 s	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Wenn Beatmung nicht möglich oder nicht erlernt, nur Thoraxkompressionen durchführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Weiter im Verhältnis 15 : 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Qualität in beiden Bereichen 90% über mind. 2 Minuten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notizen:

Quelle: AHA (2015).Guidelines Part 11: Pediatric Basic Life Support